

竹科實中健康中心

含氯漂白水之泡製方法衛教單張

- 1、 使用時穿戴防水手套並在通風良好處配製注意安全。
- 2、 避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少 15 分鐘及看醫生。
- 3、 使用濃度：
 - 環境消毒：議使用 500ppm 濃度之漂白水。
 - 病童分泌物或排泄物污染物：牆壁、地面或馬桶，建議使用 1000ppm 之漂白水。

4、 以泡製 500ppm 含氯漂白水為例：

學校購買漂白水（濃度在 5~6%）100cc（5 湯匙，一般喝湯用的湯匙，約 15~20mL）加入 10 公升的自來水（約學校水桶裝至 9 分滿或大寶特瓶每瓶容量 1,250mL，8 瓶即等於 10 公升）即調配完成 500ppm 含氯漂白水，攪拌均勻，且於 24 小時內使用。

稀釋溶液總量	配製之漂白水濃度			
	200 ppm	500 ppm	1000ppm	5000ppm
10公升	40 mL	100 mL	200 mL	1000 mL
30公升	120 mL	300 mL	600 mL	3000 mL
50公升	200 mL	500 mL	1000 mL	5000 mL
100公升	400 mL	1000 mL	2000 mL	10000mL